

Тестовые задания (1 этап)

1. Галлюцинации – это:

А) ошибочные суждения, возникшие на болезненной основе и неподдающиеся коррекции

Б) восприятие без объекта

В) рассуждения, лишённые познавательного смысла (бесплодное мудрствование)

Г) искажённое восприятие отдельных свойств предметов и явлений

Д) все верно

2. Бред – это:

А) ошибочные суждения, возникшие на болезненной основе и неподдающиеся коррекции

Б) патологически актуализировавшиеся представления, принявшие интенсивность восприятия для больного

В) рассуждения, лишённые познавательного смысла (бесплодное мудрствование)

Г) искажённое восприятие отдельных свойств предметов и явлений

Д) все верно

3. Для синдрома кандинского – клерамбо наиболее характерно:

А) сценopodobные зрительные галлюцинации.

Б) псевдогаллюцинации.

В) конфабуляции

Г) прогрессирующая амнезия

Д) верно б и в

4. Для кататонического синдрома наиболее характерно:

А) сценopodobные зрительные галлюцинации

Б) стереотипии

В) конфабуляции

Г) прогрессирующая амнезия

Д) бред преследования

5. Для маниакального синдрома характерно все, кроме:

А) эйфория

Б) фобии

В) бред величия

Г) психомоторное возбуждение

Д) ассоциативное ускорение

6. Что из числа нижеперечисленного, несомненно, свидетельствует о депрессивном синдроме?

А) бред воздействия, сниженное настроение

Б) тоска, психомоторная заторможенность, идеи самоуничтожения

В) психические автоматизмы, суицидальные мысли

Г) навязчивые сомнения, двигательная заторможенность

Д) все верно

7. Псевдогаллюцинации наблюдаются в структуре одного из указанных ниже синдромов. Определите его.

А) делирий

Б) астенический синдром

В) истерический синдром

- Г) сопор
- Д) синдром кандинского-клерамбо

8. К синдромам помраченного сознания относятся все, кроме:

- А) делириозный синдром
- Б) аментивный синдром
- В) сумеречный синдром
- Г) онейроидный синдром
- Д) истерический синдром.

9. Для депрессивного синдрома характерно:

- А) бред самоуничтожения
- Б) бред величия
- В) псевдогаллюцинации
- Г) витальная тоска
- Д) верно а и г

10. Какая клиническая картина характерна для кататонического возбуждения?

А) дурашливо-патетическое, нарочитое, нелепое поведение с двигательными расстройствами типа кривляний, манерностью, эхопраксией. Речь с дурашливыми интонациями, эхолоалией

Б) нелепое стереотипное возбуждение, сопровождающееся бессмысленной яростью, самоповреждениями, негативизмом. Речь с элементами эхолоалии и стереотипными оборотами

В) нелепое разрушительное агрессивное возбуждение с тяжелыми повреждениями окружающих вплоть до убийства. Речь бессвязна. Аффект злобы, страха, дисфория, реже – экстаз

- Г) ничего из перечисленного
- Д) всё верно

11. Для парафренного синдрома характерно:

- А) бред самоуничтожения.
- Б) сочетание бреда величия и бреда воздействия
- В) сочетание психомоторного возбуждения и бреда величия
- Г) бред обыденных отношений.
- Д) верно б и в

12. Укажите психотический синдром из числа перечисленных ниже.

- А) обсессивный синдром
- Б) психопатический синдром
- В) делириозный синдром
- Г) истерический синдром
- Д) все вышеперечисленные

13. При делирии преобладают:

- А) наплыв фантастических представлений
- Б) обилие зрительных галлюцинаций
- В) ощущение перемещения в пространстве
- Г) явления астазии-абазии
- Д) бредовые идеи величия

14. Резонерство – это:

А) склонность к детализации при вязком обстоятельном мышлении

Б) особенность мышления, при котором предложения построены грамматически

Правильно, но нет логической связи между словами

В) бесплодное мудрствование, больной знаком с понятиями высшего порядка, но конструктивно оперировать ими не может

Г) мышление не подчиняется законам логики и общества, опора делается на случайный малозначимый признак

Д) все верно

15. Укажите симптом, не относящийся к эпилептическим расстройствам.

А) аура

Б) сумеречное расстройство сознания

В) тонические судороги

Г) резонерство

Д) клонические судороги

16. Что из нижеперечисленного относится к сенестопатиям?

А) тягостные ощущения, не всегда имеющие четкую локализацию.

Б) искаженное восприятие отдельных свойств предметов и явлений.

В) отсутствие чувствительности.

Г) нарушение чувственной окраски восприятия окружающего.

Д) неприятные ощущения, ассоциированные с зоной иннервации.

17. При каком из нижеперечисленных синдромов наблюдаются псевдореминисценции?

А) невротический синдром.

Б) галлюцинаторно-параноидный синдром.

В) деменция.

Г) ни то, ни другое

Д) всё перечисленное верно

18. При каком из нижеперечисленных синдромов наблюдается раздражительная слабость?

А) астенический синдром.

Б) галлюцинаторно-параноидный синдром.

В) деменция.

Г) ни то, ни другое

Д) всё перечисленное верно

19. Астенический синдром характеризуется всем перечисленным, кроме

А) физической истощаемости

Б) психической истощаемости

В) фиксационной амнезии

Г) аффективной лабильности

20. Обсессивный синдром характеризуется

А) возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений, двигательных актов и т.д. помимо желания

- Б) сознанием их болезненности, критическим отношением к ним
- В) бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих страданий
- Г) всем перечисленным
- Д) ничем из перечисленного

21. Бредовые идеи характеризуются всем перечисленным, кроме

- А) несоответствия действительности
- Б) доступности исправления, устранения путем убеждения
- В) искажения отражения действительности
- Г) полного овладения сознания
- Д) невозможности исправления, несмотря на явное противоречие с действительностью

22. Для галлюцинаций характерно

- А) расстройство восприятия, при котором в сознании возникают зрительные образы, звуки, вкусовые обонятельные или тактильные ощущения без внешнего раздражителя
- Б) искаженное восприятие реально существующих объектов
- В) болезненное обострение чувствительности к внешним раздражителям
- Г) все перечисленное

23. Ангедония – это

- А) затруднения в передаче, психологическом описании своего состояния.
- Б) потеря чувства радости, наслаждения, удовольствия.
- В) снижение, утрата способности к активной деятельности (психической, двигательной, речевой) .
- Г) отсутствие чувствительности - тепловой, тактильной, болевой и т.д.
- Д) нарушение эмоционально-волевой сферы, характеризующееся отсутствием эмоциональных проявлений, вялостью, безразличием к себе и близким, к происходящему вокруг, отсутствием желаний, жизненных побуждений, бездеятельностью.

24. Ангедония встречается при следующих заболеваниях:

- А) болезнь паркинсона
- Б) рекуррентное депрессивное расстройство
- В) шизофрения
- Г) при всех вышеперечисленных
- Д) ни при каком из вышеперечисленных

25. В МКБ-10 выделяют следующие типы шизофрении, кроме:

- А) параноидная
- Б) гебефреническая
- В) кататонической
- Г) постшизофреническая депрессия
- Д) шизофренические реакции

26. Для депрессивной фазы биполярного аффективного расстройства

Характерно все перечисленное, исключая

- А) наличие депрессивной триады
- Б) ангедония
- В) идеи самообвинения
- Г) расстройство сна
- Д) расторможение влечений

27. К соматическим признакам депрессии относятся

- А) запоры
- Б) дисменорея
- В) похудание
- Г) все перечисленное
- Д) ничего из перечисленного

28. Для навязчивых состояний характерно все, кроме:

- А) тягостность
- Б) контрастность личностным установкам
- В) отсутствие критики
- Г) высокий уровень тревоги
- Д) ритуалы

29. Какой признак говорит в пользу дисморфофобии?

- А) идеи собственного превосходства.
- Б) стремление к самоутверждению.
- В) убежденность в наличии физического недостатка.
- Г) сверхценное отношение к собственному здоровью.
- Д) все вышеперечисленные.

30. Гипостезия — это

- а) снижение чувствительности только к тактильным раздражителям
- Б) искаженное восприятие внешних раздражителей
- В) снижение чувствительности ко всем внешним раздражителям
- Г) снижение эмоционального отклика на внешние раздражители
- Д) все верно

31. Сумеречное помрачение сознания характеризуется следующими признаками, кроме:

- А) дезориентировкой в окружающем пространстве при сохранности способности к привычным действиям
- Б) постепенным началом
- В) транзиторностью
- Г) амнезией периода помраченного сознания
- Д) деструктивным поведением

32. К какому типу расстройств относится астазия-абазия согласно критериям МКБ-10?

- А) соматоформные
- Б) диссоциативные /конверсионные
- В) невротические
- Г) психосоматические
- Д) органические

33. Для большого эпилептического припадка характерно все, кроме:

- А) конградная амнезия
- Б) ритуалы
- В) аура
- Г) тонические судороги
- Д) непроизвольное мочеиспускание